DEFINICIONES

Siempre , para realizar un procedimiento doloroso, con seguridad y sin yatrogenismo, deberemos asociar la ANALGESIA a la SEDACIÓN, dicho procedimiento es Llamado: SEDOANALGESIA.

DOLOR

*EXPERIENCIA EMOCIONAL Y
SENSORIAL DESAGRADABLE
SOCIADA A DAÑO TISULAR REAL
O POTENCIAL..*

ANSIEDAD

***DISTORCIÓN A NIVEL DE
CONCIENCIA QUE SE
TRADUCE EN UN AUMENTO
DE LA PERCEPCIÓN DEL
ENTORNO Y DE LA
REACTIVIDAD INESPECÍFICA
AL DOLOR Y VEGETATIVA.***

MÉTODOS NO FARMACOLÓGICOS DE SEDACIÓN Y ANALGESIA

- **Presencia de padres.**
- **Instrucción a los padres por parte de Enfermería.**
- **Lenguaje apropiado.**
- **Estimular la distracción y la imaginación.**

ANALGESIA:abolición de la percepción del dolor sin intención de producir sedación que en caso de aparecer será un efecto secundario de la medicación analgésica.

ANALGÉSICOS

- ❖ Locales.**
- ❖ Sistémicos –menores y mayores.**

ANALGÉSICOS LOCALES

Impiden la transmisión del impulso, logrando analgesia limitada a una zona concreta.

- **Subcutáneo-lidocaína al 1% o 2 %.**
- **Tópicos- lidocaína + prilocaína (gel ó spray).**

RECOMENDACIONES

- ❖ **No utilizar en menores de 6 meses.**
- ❖ **No utilizar en mucosas o piel lesionadas.**
- ❖ **No utilizar antes de 60 minutos de aplicada.**
- ❖ **No realizar procedimientos dolorosos en Ptes. sin ayuno de 4 a 6 horas.**

ANALGÉSICOS SISTÉMICOS MENORES

**Correspondientes al grupo de los AINE
(paracetamol, dipirona, acetaminofen
paracetamol).**

Efectos secundarios.

✓ *Rush cutáneo.*

✓ *Sangrado digestivo.*

✓ *Pirosis.*

ANALGÉSICOS SISTÉMICOS MENORES

MENORES

Recomendaciones.

- Precaución en hipersensibilidad a estas drogas*
- Precaución en alteraciones hematólogicas.*
- En administración parenteral, diluir en suero con lavado profuso del vaso .*
- Las dosis son calculadas por peso y edad.*
- Esperar 20 minutos para alcanzar, el nivel de analgesia.*

ANALGÉSICOS SISTÉMICOS MAYORES

OPIOIDES

FENTANILO

Características

- 🔒 Inicio rápido.
- 🔒 Efecto temprano.
- 🔒 Corta duración.

ANALGÉSICOS SISTÉMICOS MAYORES

OPIOIDES

EFECTOS ADVERSOS

☹ *Bradycardia e hipotensión.*

☹ *Disminuye calibre de V/A superior y bradipnea.*

ANALGÉSICOS SISTÉMICOS MAYORES

OPIOIDES

RECOMENDACIONES

☹️ *Administración lenta.*

☹️ *Administración por vías de alto flujo, con lavado profuso.*

☹️ *Monitorización cardíaca, P.A., y Sat O₂ > 95%.*

☹️ *Extremar control en usuarios con bajas reservas hemodinámicas, respiratorias y neurológicas.*

ANLGÉSICOS SISTÉMICOS MAYORES

KETAMINA

☹️ *Alucinaciones.*

☹️ *Aumento del tono muscular.*

☹️ *Convulsión.*

ANALGÉSICOS SISTÉMICOS MAYORES

KETAMINA

RECOMENDACIONES

- ☹️ No utilizar en usuarios hipertensos .
- ☹️ No utilizar en epilépticos o usuarios con antecedentes convulsivos.
- ☹️ Administrarlo siempre asociado a midazolam y atropina.
- ☹️ Utilizar vías de alto flujo.
- ☹️ Lavado profuso del vaso.

SEDACIÓN

DEFINICIONES

- Entendemos la **SEDACIÓN** como el estado de disminución de conciencia del entorno manteniendo o no los reflejos protectores, la percepción del dolor ,y la capacidad de mantener la V/A sostenible.
- **ANSIÓLISIS** o sedación conciente: depresión mínima de la conciencia, conservando respuesta adecuada a estímulos físico o verbal.
- **HIPNOSIS** o sedación profunda: depresión de la conciencia, que puede acompañada de pérdida de los reflejos protectores.

SEDACIÓN

MIDAZOLAM

CARACTERÍSTICAS

- 🔒 *Hipnótico.*
- 🔒 *Muy efectivo asociado a fentanil y ketamina.*
- 🔒 *Pico sérico en 15 min.*
- 🔒 *Efecto máximo en 50 minutos.*

SEDA CIÓN

MIDAZOLAM

EFFECTOS ADVERSOS

☹️TARDA MÁS DE 1 HORA EL DESPERTAR .

☹️Afecta la coordinación y la destreza por más de 12 horas.

RECOMENDACIONES

☹️Dejar despertar naturalmente.

☹️NO dejar retitar antes de las 3 horas.

SEDACIÓN

PROPOFOL

📦 *Presentación : ampollas de 20 ml / 200 mg.*

📦 *Concentración : 10 mg /ml.*

📦 *Dosis : 2 a 2.5 mg /kg.*

EFFECTOS ADVERSOS.

☹️ *Hipotensión arterial , raramente bradicardia.*

☹️ *Depresión respiratoria.*

☹️ *Dolor y flebitis química por infusión venosa.*

SEDACIÓN

PROPOFOL

RECOMENDACIONES

- ☹️ administración con estricto monitoreo cardíaco*
- ☹️ Administración de O₂.*
- ☹️ Administración parenteral por vías de alto flujo.*
- ☹️ Administrar lidocaína al 1 % previo a la infusión y lavar posteriormente.*

VALORACIÓN PREVIA AL PROCEDIMIENTO

FUNCIÓN

RESPIRATORIA

- ☞ Frecuencia respiratoria.
- ☞ Ventilación.
- ☞ Sat. O₂.

FUNCIÓN C V.

- ☞ frecuencia cardíaca.
- ☞ Tipo de pulsos.
- ☞ Presión arterial.

FUNCIÓN

NEUROLÓGICA

- ☞ Estado de conciencia.por APDN.

FUNCIÓN DIGESTIVA

- ☞ verificación del ayuno necesario.

- ☞ nauseas o vómito

OTROS

- ☞ Acceso vascular.
- ☞ Temperatura axilar.

VALORACIÓN DURANTE EL PROCEDIMIENTO

SEDACIÓN(*)

☞ **NIVEL 1: alerta.**

☞ **NIVEL 2: letárgico.**

☞ **NIVEL 3: despierta con
estímulos.**

☞ **NIVEL 4: no responde.**

**NIVEL 1 Y 2: ansiólisis, si no
hay agitación.**

NIVEL 3 Y 4: hipnosis.

ANALGESIA(**)

☞ **NIVEL 1: rechazo
vigoroso.**

☞ **NIVEL 2: rechazo no
vigoroso.**

☞ **NIVEL 3: no rechazo pero
llanto.**

☞ **NIVEL 4: no rechazo, no
llanto.**

**NIVEL 3 Y 4 comenzar
procedimiento.**

(*) Y (**) Unidad de tto. del dolor –UCIP-HNJM.

VALORACIÓN POSTERIOR AL PROCEDIMIENTO

FUNCIÓN RESPIRATORIA.

FUNCIÓN CARDIOVASCULAR.

FUNCIÓN NEROLÓGICA

- **APDN**
- **sopor post medicamentoso.**
- **desasosiego, excitación.**

FUNCIÓN DIGESTIVA.

OTROS. Palidez , sudoración.

Intervenciones de Enfermería

- ✦ *Oxigenación para lograr Sat O₂ >= 95%.*
- ✦ *Saturometría .*
- ✦ *Monitorización cardíaca y P.A..*
- ✦ *Valoración permanente de las diferentes funciones vitales.*
- ✦ *Colocación de vía venosa de alto flujo.*
- ✦ *Preparación de fármacos.*

Intervenciones de Enfermería

✍ REGISTRO EN PLANILLA DE LO EFECTUADO (tiempo y firma).

✍ REGISTRO DE LA VALORACIÓN.

✍ REGISTRO PREVIA VERIFICACIÓN, DE LA CONDICIÓN NEUROLÓGICA DEL USUARIO AL RETIRARSE.