DISONANCIAS EN EL NIÑO

Iones		Valores normales	Alteración
Sodio	Na	135 a 145 mEq/l	Hiponatremia Hipernatremia
Potasio	K	3,5 a 5 mEq/l	Hipopotasemia Hiperpotasemia
Calcio	Ca	8,5 a 11 mg/dl	Hipocalcemia Hipercalcemia
Calcio iónico	Ca	1,1 a 1,3 mmol/l	
Magnesio	Mg	1,5 a 2,2 mEq/l	Hipomagnesemia Hiper magnesemia

HIPONATREMIA

[Na] plasmática ≤ 130 mEq/l

Clínica y causas:

	Hipovolemia	Normovolemia	Hipervolemia
	Deshidratación	Deshidratación ausente	edemas
Síntomas y signos.	<ul style="list-style-type: none">•Letargia•Hipotensión•Pliegue hipoelástico•Mucosas secas•Disminución de lagrimas•Disminución de sudor•Oliguria	<ul style="list-style-type: none">•Edemas ausentes o leves.•Síntomas neurológicos	<ul style="list-style-type: none">•Edema pulmonar

	Hipovolemia	Normovolemia	Hipervolemia
	Deshidratación	Deshidratación ausentes	edemas
Causas:	<ul style="list-style-type: none"> •Gastroenteritis •Tercer espacio (peritonitis ascitis) •Quemaduras •Fibrosis quística •Diuréticos •Insuficiencia suprarenal •Síndrome pierde sal •Nefropatías 	<ul style="list-style-type: none"> •SIHAD •Intoxicación acuosa 	<ul style="list-style-type: none"> •Insuficiencia cardiaca •Nefrosis •Cirrosis •Insuficiencia renal.

✘ La hiponatremia es en general una manifestación secundaria de una enfermedad primaria.

✘ S.N.C. ↓ (Na)

↓ osmolaridad plasmática

Esto determina que pase agua libre hacia el cerebro. La sobrehidratación del cerebro, lleva al edema cerebral convulsiones, coma y muerte

Na

Na

H₂O

- ✘ OBJETIVO DEL TTO.
- ✘ Mantenimiento de una volemia adecuada.
- ✘ Elevación rápida del sodio sérico si existe sintomatología aguda.
- ✘ Eliminación del exceso de agua
- ✘ Mantenimiento de un sodio sérico normal.
- ✘ Tratar la enfermedad subyacente.
- ✘ Agudo o crónico .
- ✘ severidad. Con $\text{Na} < 120 \text{ mEq/l}$ se corrigen sin importar la causa.

PREGUNTAS :

¿Con qué solución se corrige una hiponatremia severa?

¿Con qué solución se corrige una hiponatremia leve o moderada?

¿Cuáles son las soluciones que contienen mayor porcentaje de sodio?

¿Cómo se prepara una solución de NaCl al 3%?

¿Cuál es la dosis que se utiliza para la corrección?

- ✘ Toda hiponatremia aguda y severa ($\text{Na} < 120$ mEq/l) o sintomática debe ser corregida con sodio por vía intravenosa.
- ✘ LLEVAR LA NATREMIA A LIMITES DE SEGURIDAD 130 mEq/l
- ✘ Formula
- ✘ mEq de Na requeridos: $(\text{Na deseado} - \text{Na actual}) \times 0.6 \times \text{Kg de peso}$
- ✘ tiempo: entre 1 y 4 horas
- ✘ La normalización de la natremia debe llevarse a cabo en el resto de las 24 horas

PREPARACIÓN DE NaCl AL 3%

NaCl (molar)	58.5mg	1ml	1mEq
NaCl (al 10%)	100 mg	1ml	1.7 mEq
NaCl molar	0.585g	-----10ml	
	3g	----- x	

X=51.28ml NaCl molar hasta completar 100 ml de solución.

NaCl al 10%	1g	-----10ml	
	3g	----- x	

X=30 ml NaCl al 10% hasta completar 100 ml de solución.

HIPERNATREMIA

- ✗ [Na] plasmática > 150mEq/l
- ✗ Se produce por dos mecanismos:
 - Perdida excesiva de agua libre
 - Ganancia excesiva de solutos que contengan sodio

CAUSAS

Perdida de agua sola o pobre en sodio

- Enfermedad diarreica
- Sudoración excesiva
- Diabetes insípida
- Diuresis osmótica

Falla en reposición de agua

- Vómitos
- No disponibilidad de agua

Aporte excesivo de sodio

- Soluciones de rehidratación oral muy concentradas
- Formulas o leche materna con exceso de sodio
- Exceso en el aporte de bicarbonato

CLINICA

- ✘ ALTERACION DEL ESTADO DE CONCIENCIA.
- ✘ Irritabilidad
- ✘ Letargia
- ✘ Coma
- ✘ Sed intensa
- ✘ Hipertermia
- ✘ Convulsiones
- ✘ Hemorragia cerebral masiva

TRATAMIENTO

- ✘ Orientado a corregir la hipernatremia y suprimir la causa que la provoco.
- ✘ Hipernatremia leve o moderada
 $\text{Na} > 150 \text{ mEq/l} < 160 \text{ mEq/l}$
- ✘ Hipernatremia severa
 $\text{Na} > 160 \text{ mEq/l} < 180 \text{ mEq/l}$
- ✘ Hipernatremia muy severa
 $\text{Na} > 180 \text{ mEq/l}$

HIPOPOTASEMIA-HIPOCALIEMIA

- ✗ $[K] < 3.5 \text{ mEq/l}$
- ✗ CLINICA: Debilidad muscular
 - Íleo paralítico
 - Arritmias
 - Alteraciones importantes en el E.C.G

CAUSAS

Perdidas renales	<ul style="list-style-type: none">• Tubulopatías• Diuréticos
Perdidas digestivas	<ul style="list-style-type: none">• Vómitos• Diarreas
Pasaje de potasio de extra al intracelular	<ul style="list-style-type: none">• Insulina• B2 adrenérgicos• Alcalosis• Bicarbonato

TRATAMIENTO

- ✘ Hipopotasemia leve-moderada y asintomática
[K] 2.5 mEq/l < 3.5mEq/l
- ✘ No requiere medidas específicas de tto.se dirigirá a la causa que la provoco y se incrementara aporte de K basales
- ✘ Hipopotasemia severa o sintomática
[K] < 2.5 mEq/l
- ✘ Aporte de KCl: 40 a 60 mEq/l (administrar V.V.P)
Tiempo de corrección:4 a 6 horas
- ✘ Velocidad de infusión:0.5 a 1 mEq/Kg/hora
- ✘ Aporte de KCl: 60 a 80 mEq/l (administrar V.V.C)
- ✘ EL NIÑO DEBE ESTAR MONITORIZADO

HIPERPOTASEMIA-HIPERCALIEMIA

- ✗ $[k] > 5.5 \text{ mEq/l}$
- ✗ CLINICA: Parestesias

Parálisis

Arritmias ventriculares

Alteraciones importantes en el E.C.G

P.C.R

CAUSAS

Disminución de excreción

- Insuficiencia renal
- Insuficiencia adrenal
- Espironolactona
- Betabloqueantes

Pasaje de potasio del intra a extra celular

- Acidosis
- Síndrome de lisis tumoral
- Trauma

Aumento del ingreso de potasio

- Aporte excesivo
- Iatrogenia

-
- ✘ Hiperpotasemia leve-moderada
[k] $5.5 < 6$ mEq/l
 - ✘ Habitualmente es por insuficiencia renal pre renal se corrige al rehidratar al paciente.
 - ✘ Hiperpotasemia grave[K] > 6.5 mEq/l (si el paciente esta bien hidratado o oligoanúrico, la causa seguramente sea por insuficiencia renal parenquimatosa)

TRATAMIENTO DE LA HIPERPOTASEMIA SEVERA

- 1) Gluconato de calcio al 10%
0.5 a 1ml/Kg I/V lento(2 a 5 minutos)
- 2) Bicarbonato de sodio $\frac{1}{2}$ molar.
1 a 2 mEq/kg lento (5 a 10 minutos)
- 3) Glucosa al 10%
0.5 a 1g/kg
insulina cristalina I/V 0.25 a 1 unidad/Kg/H
- 4) Salbutamol I/V o inhalatorio
- 5) Resinas de intercambio iónico (kayexalate)
Dosis 1 g/kg.
Vía rectal, enema, se utiliza combinado con sorbitol al 20 o 25 %.
Se administra 3 ml de sorbitol por cada gramo de kayexalate.
Vía Oral: por SNG, el kayexalate puede diluirse en glucosado al 10 % o con sorbitol al 70 %.
Puede repetirse cada 4 o 6 hs.
- 6) Diálisis

CALCIO

- ✘ Hipocalcemia [Ca] iónico < 1,1 mmol/l
- ✘ Causas: Hipotiroidismo
Resistencia de los efectores de la hormona paratiroidea.
- ✘ Clínica: excitabilidad neuromuscular (tetania, convulsiones, alteración de la contractilidad cardiaca, arritmias graves)
- ✘ Tratamiento: hipocalcemia sintomática, administrar gluconato de calcio al 10 %.
Dosis: 0,5 a 1 ml/kg administrar en 10 minutos.

-
- ✘ Hipercalcemia [Ca] iónico > 1,3 mmol/l
 - ✘ Es excepcional en niños.
 - ✘ Tratamiento: tratar la causa subyacente.

MAGNESIO

- ✘ Hipomagnesemia :[Mg] < 1,5 mEq/l.
- ✘ Causas: enfermedades gastrointestinales
Perdidas renales
Enfermedades endocrinológicas
- ✘ Clínica: irritabilidad neuromuscular, ataxia, nistagmo, convulsiones.
- ✘ Tratamiento: Sulfato de magnesio I/V 25 a 50 mg/kg.
- ✘ Hipermagnesemia: [Mg] >2,2 mEq/l
- ✘ Es rara en niños (generalmente accidental)